

<h2>Dapagliflozin Tablets</h2> <h3>DAPACOOOL-10 MG</h3> <p>डापाक्लू-10 एमजी Tablets</p>					
10 x 10 Tablets					
<p>Composition : Each film coated tablet contains : Dapagliflozin Propanediol Monohydrate equivalent to Dapagliflozin 10 mg. Excipients q.s.</p>		<p>Storage : Store protected from moisture at a temperature not exceeding 30°C.</p> <p>CAUTION : Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner.</p> <p>Keep the medicine out of reach of children.</p> <p>Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd. At-Plot No. 52, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403, Uttarakhand.</p>			
<p>Dosage : As directed by the Physician.</p>					



DAPACOOOL-10 (Dapagliflozin 10 mg टैबलेट)

उत्पाद अवलोकन: DAPACOOOL-10 में Dapagliflozin होता है, जो एक मौखिक दवा है जिसका उपयोग प्रकार 2 मधुमेह (टाइप 2 डायबिटीज़) के प्रबंधन में किया जाता है। यह रक्त शर्करा स्तर को कम करने में मदद करता है, किडनी में ग्लूकोज़ के पुनः अवशोषण को रोककर और इसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है।

दवा वर्ग:

- **Dapagliflozin:** सोडियम-ग्लूकोज़ को-ट्रांसपोर्टर 2 (SGLT2) अवरोधक

संकेत और उपयोग: DAPACOOOL-10 के लिए संकेतित है:

- वयस्कों में प्रकार 2 मधुमेह (टाइप 2 डायबिटीज़) का प्रबंधन, आहार और व्यायाम के साथ।
- इसे अकेले या अन्य एंटी-डायबिटिक दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

खुराक और प्रशासन:

- **वयस्कों के लिए:** सामान्य अनुशंसित खुराक एक टैबलेट (10 mg) प्रति दिन एक बार, सुबह के समय, भोजन के साथ या बिना भोजन के।
- **प्रशासन:** टैबलेट को पानी के साथ पूरी तरह निगल लें। टैबलेट को चबाएं या कुचलें नहीं।
- **महत्वपूर्ण:** अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशों का पालन करें और उपचार की अवधि और खुराक समायोजन के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मूत्र पथ संक्रमण
- मूत्र की आवृत्ति बढ़ जाना
- प्यास
- मतली

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- यीस्ट संक्रमण
- निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन)
- निर्जलीकरण
- कीटोएसिडोसिस (खून में कीटोन की उच्च मात्रा के साथ गंभीर स्थिति)

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- रक्त शर्करा स्तर की नियमित निगरानी करें।
- किसी भी अन्य दवाओं या स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- मूत्र पथ संक्रमण या किडनी की समस्याओं के इतिहास वाले मरीजों में सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
- यदि कीटोएसिडोसिस के लक्षण (जैसे, मतली, उल्टी, पेट दर्द, या भ्रम) अनुभव करें, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें।

दवा इंटरैक्शन:

- DAPACOOOL-10 अन्य दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है जो रक्त शर्करा स्तर को प्रभावित करती हैं, मूत्रवर्धक, या दवाएं जो किडनी के कार्य को प्रभावित करती हैं। आप जो भी अन्य दवाएं और सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनके बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।

निषेध:

- Dapagliflozin या उत्पाद के किसी भी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- गंभीर किडनी की हानि या अंतिम-चरण किडनी रोग।
- प्रकार 1 मधुमेह (टाइप 1 डायबिटीज़)।

करने और न करने योग्य बातें: करने योग्य:

- दवा को अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अनुसार लें।
- नियमित रूप से रक्त शर्करा की निगरानी करें और नियमित फॉलो-अप रखें।
- हाइड्रेटेड रहें और कोई भी असामान्य लक्षण अनुभव होने पर अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।

न करने योग्य:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के अचानक बंद न करें।
- गंभीर किडनी हानि वाले मामलों में बिना चिकित्सा सलाह के इसका उपयोग न करें।

DAPACOOOL-10 लेने से पहले:

- अपनी पूरी चिकित्सा इतिहास पर अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करें, जिसमें किसी भी एलर्जी, मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां, और वर्तमान दवाएं शामिल हैं।

- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग स्वयं-दवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित खुराक में परिवर्तन न करें।

इकॉन हेल्थकेयर का गुणवत्ता उत्पाद

संपर्क जानकारी:

- **पता:** 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** info@econhealthcare.net
- **वेबसाइट:** www.econhealthcare.net

सभी अधिकार इकॉन हेल्थकेयर के पास सुरक्षित हैं