



## Dxcon (डुलोकसेटीन 30 mg SR टैबलेट)

### उत्पाद विवरण:

Dxcon एक सस्टेन्ड-रिलीज़ टैबलेट है जिसमें 30 मिलीग्राम डुलोकसेटीन होता है, जो सेरोटोनिन-नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इन्हिबिटर्स (SNRIs) के वर्ग में आता है। यह दवा धीरे-धीरे डुलोकसेटीन को समय के साथ रिलीज़ करने के लिए बनाई गई है ताकि रक्त प्रवाह में दवा के स्थिर स्तर बनाए रखे जा सकें।

### दवा का वर्ग:

- **डुलोकसेटीन:** सेरोटोनिन-नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इन्हिबिटर (SNRI)

### संकेत और उपयोग:

Dxcon निम्नलिखित स्थितियों के लिए संकेतित है:

- मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर (MDD)

- जनरलाइज्ड एंगजाइटी डिसऑर्डर (GAD)
- डायबेटिक परिधीय न्यूरोपैथिक दर्द
- फाइब्रोमायल्जिया
- क्रोनिक मस्क्युलोस्केलेटल दर्द

### **खुराक और प्रशासन:**

- आमतौर पर अनुशंसित खुराक एक 30 मिलीग्राम SR टैबलेट एक बार दैनिक है।
- इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है।
- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशों का पालन करें।

### **सामान्य दुष्प्रभाव:**

- मतली
- मुंह का सूखापन
- थकान
- कब्ज
- चक्कर आना
- अनिद्रा

### **कम सामान्य दुष्प्रभाव:**

- रक्तचाप में वृद्धि
- पसीना
- धुंधली दृष्टि
- मांसपेशियों में दर्द
- वजन में परिवर्तन

### **चेतावनियाँ और सावधानियाँ:**

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- अपने डॉक्टर को किसी अन्य सप्लीमेंट्स या दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं।
- नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करें, क्योंकि यह दवा कुछ रोगियों में रक्तचाप बढ़ा सकती है।
- यदि आप किसी गंभीर दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो उपयोग बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस उत्पाद का उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें।

### **दवा के परस्पर प्रभाव:**

- Dxcin अन्य दवाओं, जैसे MAO इन्हिबिटर्स, ब्लड थिनर्स, और कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है। हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को किसी भी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं।

### **निषेध:**

- डुलोकसेटीन या टैबलेट में किसी भी अन्य सामग्री के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- अनियंत्रित संकीर्ण-कोण मोतियाबिंद।

### **क्या करें और क्या न करें:**

#### **क्या करें:**

- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशानुसार दवा लें।

- उपचार के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखें।

#### **क्या न करें:**

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- इस दवा का सेवन करते समय शराब का सेवन न करें, क्योंकि इससे लीवर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है।

#### ***Dxcon लेने से पहले:***

- अपने डॉक्टर के साथ अपनी पूरी चिकित्सा इतिहास, जिसमें कोई भी एलर्जी या मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल हैं, पर चर्चा करें।
- अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं, या स्तनपान कर रही हैं।

#### ***अस्वीकरण:***

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे स्व-चिकित्सा के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित खुराक को न बदलें।

#### ***Econ Healthcare का गुणवत्ता उत्पाद***

#### **संपर्क जानकारी:**

- **पता:** 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** [info@econhealthcare.net](mailto:info@econhealthcare.net)

- वेबसाइट: [www.econhealthcare.net](http://www.econhealthcare.net)

*सभी अधिकार Econ Healthcare के लिए सुरक्षित हैं।*