



लासेट्रा (मॉंटेनुकास्ट सोडियम 10 मिलीग्राम + लेवोसेटिरिज़ीन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम टैबलेट)

उत्पाद अवलोकन: लासेट्रा एलर्जी और अस्थमा के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली एक संयोजन दवा है। यह मॉंटेनुकास्ट, एक ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर प्रतिपक्षी, और लेवोसेटिरिज़ीन, एक एंटीहिस्टामाइन को मिलाता है। यह फॉर्मूलेशन मौसमी एलर्जी से जुड़े लक्षणों से राहत प्रदान करता है और अस्थमा के दौरे की रोकथाम में मदद करता है।

दवा वर्ग:

- **मॉंटेनुकास्ट:** ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर प्रतिपक्षी
- **लेवोसेटिरिज़ीन:** एंटीहिस्टामाइन

संकेत और उपयोग: लासेट्रा के लिए संकेतित है:

- एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों से राहत, जैसे बहती नाक, छींक और खुजली।
- क्रॉनिक अर्टिकेरिया (पित्ती) का उपचार।
- अस्थमा की रोकथाम और दीर्घकालिक प्रबंधन।

खुराक और प्रशासन:

- सामान्यतः अनुशंसित खुराक शाम को एक टैबलेट है, भोजन के साथ या बिना, या जैसा आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित किया गया हो।
- उपचार की अवधि के संबंध में अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- उर्नीदापन
- सिरदर्द
- थकान
- मुंह का सूखापन

कम आम दुष्प्रभाव:

- पेट दर्द
- चक्कर आना
- दाने
- खांसी

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- जब तक आप यह नहीं जानते कि दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता वाली गतिविधियों, जैसे ड्राइविंग, से बचें।
- आप जो भी अन्य दवाएं या सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यदि आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव होता है, तो उपयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा सावधानीपूर्वक आकलन पर आधारित होना चाहिए।

दवा इंटरैक्शन:

- लासेट्रा कुछ दवाओं जैसे फेनोबार्बिटल, फेनाइटोइन, और रिटोनाविर के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। आप जो भी अन्य दवाएं ले रहे हैं, उनके बारे में हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सूचित करें।

निषेध:

- मॉटेनुकास्ट, लेवोसेटिरिज़ीन, या उत्पाद के किसी भी अन्य घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- गंभीर गुर्दे की हानि वाले रोगी (10 मिली/मिनट से कम क्रिएटिनिन क्लियरेंस)।

करने और न करने योग्य बातें: करने योग्य:

- अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशानुसार दवा लें।
- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों के बारे में सूचित करें, जैसे कि यकृत या गुर्दे की समस्याएं।

न करने योग्य:

- अनुशंसित खुराक से अधिक न लें।
- इस दवा को लेते समय शराब का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे उर्नीदापन बढ़ सकता है।

लासेट्रा लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर के साथ अपनी पूरी चिकित्सा इतिहास पर चर्चा करें, जिसमें किसी भी एलर्जी या मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां शामिल हैं।
- अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसका उपयोग स्वयं-दवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित चिकित्सा सलाह और उपचार के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित खुराक में परिवर्तन न करें।

इकॉन हेल्थकेयर का गुणवत्ता उत्पाद

संपर्क जानकारी:

- पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद
- फोन: +91 635-6666-700
- ईमेल: info@econhealthcare.net
- वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सभी अधिकार इकॉन हेल्थकेयर के पास सुरक्षित हैं