



BLOCEF-200 टैब

Econ Healthcare Pvt Ltd

सामान्य जानकारी

BLOCEF-200 टैब एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो **Econ Healthcare Pvt Ltd** द्वारा निर्मित है। इसमें **सेफ्पोडोक्साइम डिस्पर्सिबल 200 मिलीग्राम** शामिल है। सेफ्पोडोक्साइम एक तीसरी पीढ़ी की सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोककर संक्रमण का प्रभावी रूप से इलाज करता है। BLOCEF-200 तेजी से अवशोषित होता है, जिससे यह बैक्टीरियल संक्रमणों से लड़ने में प्रभावी होता है।

दवा वर्ग

- **सेफ्पोडोक्साइम**: तीसरी पीढ़ी की सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक

संकेत और उपयोग

BLOCEF-200 टैब निम्नलिखित बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोगी है:

- श्वसन तंत्र संक्रमण (जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया)
- मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई)
- त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण
- टॉन्सिलिटिस और फेरिजाइटिस
- ओटाइटिस मीडिया (कान का संक्रमण)
- साइनसाइटिस
- असंबंधित गोनोरिया

यह दवा बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है और संक्रमण प्रबंधन में विश्वसनीय परिणाम प्रदान करती है।

सामान्य और कम सामान्य साइड इफेक्ट्स

सामान्य साइड इफेक्ट्स

- मतली
- डायरिया
- उल्टी
- पेट में असुविधा

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स

- सिरदर्द
- चक्कर आना
- त्वचा पर खुजली या चकत्ते
- थकान
- योनि यीस्ट संक्रमण

यदि कोई गंभीर साइड इफेक्ट या एलर्जी प्रतिक्रिया हो (जैसे सूजन, सांस लेने में कठिनाई, या गंभीर त्वचा पर चकत्ते), तो तुरंत उपयोग बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। आमतौर पर, BLOCEF-200 को दिन में दो बार भोजन के बाद या बिना भोजन के लिया जाता है।

- **प्रशासन:** टैबलेट को थोड़े पानी में घोलें और तुरंत सेवन करें। डॉक्टर के निर्देश के बिना टैबलेट को चबाएं या पूरा न निगलें।
-

चेतावनियां और सावधानियां

- जिन मरीजों को सेफलोस्पोरिन या पेनिसिलिन से एलर्जी है, वे BLOCEF-200 से बचें।
 - किडनी या लिवर की समस्याओं वाले मरीजों में इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
 - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर लें।
 - दवा की खुराक समय पर लें और इसे छोड़ें नहीं, ताकि इलाज प्रभावी हो।
-

दवा के अंतःक्रिया

अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में सूचित करें जो आप ले रहे हैं, जैसे:

- एंटासिड (यह सेफ्पडोक्साइम के अवशोषण को कम कर सकता है)।
 - ब्लड थिनर्स (जैसे वारफारिन)।
 - अन्य एंटीबायोटिक्स (प्रभावशीलता कम या प्रतिरोध से बचने के लिए)।
 - प्रोबेनेसिड (यह सेफ्पडोक्साइम के रक्त स्तर को बढ़ा सकता है)।
-

निषेध

- सेफ्पडोक्साइम या अन्य सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
 - पेनिसिलिन से गंभीर एलर्जी वाले मरीज।
 - गंभीर जठरांत्र संबंधी स्थितियां जैसे कोलाइटिस।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- निर्धारित उपचार के पूरे कोर्स को पूरा करें, भले ही लक्षणों में सुधार हो।
- दवा को ठंडी, सूखी जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
- अपनी मेडिकल हिस्ट्री और एलर्जी के बारे में डॉक्टर को सूचित करें।

क्या न करें

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना खुराक को छोड़ें या दवा को समय से पहले बंद न करें।
- इलाज के दौरान शराब का सेवन न करें, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है।
- इस दवा का उपयोग वायरल संक्रमणों के लिए न करें जैसे सर्दी या फ्लू।

BLOCEF-200 टैब लेने से पहले

- अपने डॉक्टर को किडनी या लिवर की बीमारी, जठरांत्र विकार, या एलर्जी के इतिहास के बारे में सूचित करें।
- सभी चल रही दवाओं, सप्लीमेंट्स, या हर्बल उत्पादों के बारे में डॉक्टर को बताएं।
- गर्भावस्था या स्तनपान की योजना से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करती है। हमेशा BLOCEF-200 टैब को अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में उपयोग करें। डॉक्टर से परामर्श किए बिना निर्धारित खुराक को न बदलें या बंद करें।

संपर्क जानकारी

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, प्रथम मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित

सभी अधिकार **Econ Healthcare Pvt Ltd** के पास सुरक्षित हैं।