



CEFCON 2 GM INJ और CEFCON INJ

Econ Healthcare Pvt Ltd का उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद

सामान्य जानकारी

CEFCON 2 GM INJ और CEFCON INJ Econ Healthcare Pvt Ltd के उच्च गुणवत्ता वाले इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स हैं, जिनमें क्रमशः Ceftriaxone 2 gm और Ceftriaxone 1 gm होता है। Ceftriaxone एक तृतीय-पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवार के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया को नष्ट करता है और उनके विकास को रोकता है। यह दवा विभिन्न बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए उपयोग की जाती है और इसे चिकित्सीय निगरानी में क्लिनिकल सेटिंग में प्रशासित किया जाता है।

दवा का वर्ग

- वर्ग: तृतीय-पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक

संकेत और उपयोग

CEFCON INJ निम्नलिखित संक्रमणों के उपचार में उपयोगी है:

- श्वसन तंत्र संक्रमण
- मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI)
- त्वचा और सॉफ्ट टिशू संक्रमण
- हड्डी और जोड़ संक्रमण
- रक्त संक्रमण (सेप्सिस)
- पेट के संक्रमण
- मेनिन्जाइटिस
- ऑपरेशन के बाद के संक्रमण

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव

- इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन
- मतली या उल्टी
- दस्त
- खुजली या दाने

कम सामान्य दुष्प्रभाव

- सिरदर्द
- चक्कर आना
- लिवर एंजाइम का बढ़ना
- एलर्जिक प्रतिक्रिया, जैसे चेहरे पर सूजन या सांस लेने में कठिनाई (ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें)

खुराक और प्रशासन

- **खुराक:** खुराक संक्रमण की गंभीरता, मरीज की आयु, वजन, और किडनी फंक्शन के आधार पर डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **प्रशासन:** इसे इंट्रामस्क्यूलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन के रूप में एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसे स्वयं न लें।

चेतावनियां और सावधानियां

- यदि आपको **Ceftriaxone**, पेनिसिलिन, या अन्य सेफालोस्पोरिन से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - किडनी या लिवर की समस्या वाले मरीज इसे सावधानी से लें।
 - उपचार के दौरान एलर्जिक प्रतिक्रिया के संकेतों पर नजर रखें।
 - उच्च बाइलरुबिन स्तर वाले नवजात शिशुओं या प्रीमैच्योर शिशुओं में उपयोग से बचें।
 - **Ceftriaxone** को कैल्शियम युक्त सॉल्यूशंस के साथ न मिलाएं या एक साथ न दें।
-

दवा अंतःक्रियाएं

अपने डॉक्टर को निम्नलिखित के उपयोग की जानकारी दें:

- कैल्शियम युक्त IV सॉल्यूशंस
 - मौखिक एंटीकॉगुलेंट्स
 - अन्य एंटीबायोटिक्स
 - प्रोबेनेसीड
-

निषेध (Contraindications)

- **Ceftriaxone** या सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स से ज्ञात अतिसंवेदनशीलता
 - पेनिसिलिन से गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया का इतिहास
 - कैल्शियम युक्त IV सॉल्यूशंस की आवश्यकता वाले नवजात शिशु
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- दवा को डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें।
- किसी भी दुष्प्रभाव या असामान्य लक्षणों की जानकारी अपने डॉक्टर को दें।
- उपचार के दौरान सही हाइड्रेशन सुनिश्चित करें।

क्या न करें

- खुराक को न छोड़ें या उपचार को जल्दी बंद न करें।
 - स्वयं दवा न लें या डॉक्टर से परामर्श के बिना खुराक न बदलें।
 - एक्सपायर या गलत तरीके से स्टोर की गई दवा का उपयोग न करें।
-

CEFCON INJ लेने से पहले

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री साझा करें, विशेष रूप से एलर्जी, लिवर या किडनी की समस्या, और किसी भी चल रहे उपचार की जानकारी।

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। **CEFCON 2 GM INJ** और **CEFCON INJ** का उपयोग हमेशा डॉक्टर के निर्देशानुसार करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक को न बदलें या बंद न करें।

संपर्क जानकारी

Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सर्वाधिकार सुरक्षित

सभी अधिकार **Econ Healthcare Pvt Ltd** के पास सुरक्षित हैं।