



CEFICOOL-O TAB

संरचना: सेफिक्साइम 200mg + ओफ्लॉक्ससिन 200mg

सामान्य जानकारी

CEFICOOL-O TAB, सेफिक्साइम और ओफ्लॉक्ससिन का संयोजन है, जो क्रमशः सेफालोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोलोन वर्ग की दो प्रभावी एंटीबायोटिक दवाएं हैं। यह संयोजन बैक्टीरिया की कोशिका दीवार के निर्माण और डीएनए प्रतिकृति को अवरुद्ध करके हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है।

वर्ग

- **सेफिक्साइम:** तीसरी पीढ़ी की सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक।
- **ओफ्लॉक्ससिन:** फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक।

संकेत और उपयोग

CEFICOOL-O TAB का उपयोग निम्नलिखित बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है:

- श्वसन तंत्र संक्रमण।
 - मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI)।
 - गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण।
 - टाइफाइड बुखार।
 - त्वचा और नरम ऊतक संक्रमण।
 - स्त्री रोग संबंधी संक्रमण।
-

आम और कम आम दुष्प्रभाव

- **आम:** मतली, दस्त, सिरदर्द, चक्कर आना, पेट दर्द और भूख में कमी।
 - **कम आम:** एलर्जी प्रतिक्रियाएं (खुजली, दाने), धुंधला दृष्टि और जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द। यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बढ़ता है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
-

खुराक और प्रशासन

- CEFICOOOL-O TAB को डॉक्टर के निर्देशानुसार लें, आमतौर पर दिन में एक या दो बार।
 - इसे भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, लेकिन पेट की परेशानी कम करने के लिए भोजन के साथ लेना बेहतर है।
 - बैक्टीरिया प्रतिरोध को रोकने के लिए उपचार का पूरा कोर्स पूरा करें, भले ही आप बेहतर महसूस करें।
-

चेतावनी और सावधानियां

- सेफालोस्पोरिन या फ्लोरोक्विनोलोन के प्रति एलर्जी वाले मरीजों में उपयोग से बचें।
 - किडनी या लिवर की समस्याओं वाले व्यक्तियों में सावधानी से उपयोग करें।
 - चक्कर आ सकता है; यदि प्रभावित हों तो वाहन चलाने या भारी मशीनरी चलाने से बचें।
 - ओपलॉक्सासिन सूर्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है; लंबे समय तक धूप के संपर्क से बचें।
-

दवा परस्पर क्रिया

- एंटासिड और आयरन सप्लीमेंट ओपलॉक्सासिन के अवशोषण को कम कर सकते हैं; इन्हें एक साथ न लें।
 - ब्लड थिनर, एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं और अन्य एंटीबायोटिक्स के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है।
 - अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं की जानकारी दें जो आप ले रहे हैं।
-

निषेध

- सेफिक्साइम, ओफ्लॉक्सासिन या दवा के किसी अन्य घटक के प्रति संवेदनशीलता।
 - बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भवस्था या स्तनपान के दौरान अनुशंसित नहीं।
-

क्या करें और क्या न करें

- **करें:** डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और उपचार के दौरान हाइड्रेशन बनाए रखें।
 - **न करें:** दवा को समय से पहले बंद न करें या निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
-

दवा लेने से पहले

अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि:

- आपको किडनी या लिवर की समस्याएं हैं।
 - आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं।
 - आप अन्य कोई दवाएं ले रहे हैं, जिनमें ओवर-द-काउंटर दवाएं या सप्लीमेंट शामिल हैं।
-

अस्वीकरण

यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और डॉक्टर के निर्देशों का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा को शुरू करने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के बिना निर्धारित खुराक न बदलें।

Econ Healthcare Pvt Ltd

Econ Healthcare Pvt Ltd का एक गुणवत्ता उत्पाद।

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद।

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सभी अधिकार Econ Healthcare के लिए सुरक्षित।