



Rx
Amoxycillin and
Potassium Clavulanate
Tablets IP 625 mg

CLAV-AMO
क्लेव-एमो Tablets

10 x 10 Tablets

Each film coated tablet contains :
Amoxycillin Trihydrate IP
eq. to Amoxycillin 500 mg
Potassium Clavulanate Diluted IP
eq. to Clavulanic Acid 125 mg
Colour : Titanium Dioxide IP
Dosage : As directed by the Physician.

Storage :
Store protected from light & moisture,
at a temperature not exceeding 25°C.

Keep all medicines out of reach of children.

SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION
Not to be sold by retail without the prescription
of a Registered Medical Practitioner.

Manufactured by :
Malik Lifesciences Pvt. Ltd.
(A subsidiary of
Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.)
Plot No.16, Vardhman Indl. Estate, Vill- Bahadarpur
Saini, N.H.58, Haridwar-247667 (Uttarakhand)

CLAV-AMO TAB

संरचना: अमोक्सिसिलिन 500mg + पोटेशियम क्लेवुलानेट 125mg

सामान्य जानकारी:

CLAV-AMO TAB एक संयोजन एंटीबायोटिक है जो **पेनिसिलिन वर्ग** से संबंधित है। अमोक्सिसिलिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकता है, जबकि पोटेशियम क्लेवुलानेट इसके प्रभाव को बढ़ाता है और बैक्टीरियल प्रतिरोध को रोकता है। यह संयोजन विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए प्रभावी और भरोसेमंद उपचार प्रदान करता है।

संकेत और उपयोग:

CLAV-AMO TAB का उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे:

- श्वसन पथ के संक्रमण (जैसे साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया)
- मूत्र मार्ग संक्रमण
- त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण
- हड्डी और जोड़ संक्रमण

- दंत संक्रमण
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव:

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मतली
- दस्त
- उल्टी

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चकत्ते
- सिरदर्द
- थकान
- हल्का पेट दर्द

यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या बढ़ जाता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

खुराक और प्रशासन:

- CLAV-AMO TAB को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
 - आमतौर पर इसे दिन में दो बार भोजन के बाद लिया जाता है ताकि पेट की समस्या कम हो।
 - टैबलेट को न चबाएं या कुचलें; इसे पानी के साथ साबुत निगलें।
-

चेतावनी और सावधानियां:

- यदि आपको पेनिसिलिन या सेफालोस्पोरिन से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - गुर्दे या जिगर की समस्याओं वाले मरीजों में सावधानी से उपयोग करें।
 - खुराक छोड़ने से बचें ताकि उपचार प्रभावी हो और प्रतिरोध न हो।
-

दवा परस्पर क्रियाएं:

- मौखिक गर्भनिरोधकों के प्रभाव को कम कर सकता है।
 - बिना चिकित्सकीय सलाह के एलोप्सूरिनोल या प्रोबेनेसिड के साथ उपयोग न करें।
-

मतभेद:

- अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानेट, या किसी अन्य पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।
- पिछले अमोक्सिसिलिन-क्लेवुलानेट उपयोग से संबंधित जिगर की समस्या।

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- लक्षणों में सुधार होने पर भी दवा का पूरा कोर्स लें।
- दवा लेते समय हाइड्रेटेड रहें।

क्या न करें:

- यह दवा दूसरों के साथ साझा न करें, भले ही उनके लक्षण समान हों।
- उपचार के दौरान शराब का सेवन न करें।

CLAV-AMO TAB लेने से पहले:

- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, विशेष रूप से गुर्दे या जिगर की समस्याओं के बारे में चर्चा करें।
- वर्तमान में ली जा रही सभी दवाओं और पूरकों का विवरण साझा करें।

CLAV-AMO TAB **Econ Healthcare Pvt Ltd** का एक **गुणवत्तापूर्ण उत्पाद** है, जो मरीजों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें:

- **पता:** 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद
- **फोन:** +91 635-6666-700
- **ईमेल:** info@econhealthcare.net
- **वेबसाइट:** www.econhealthcare.net

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। निर्धारित खुराक को बिना चिकित्सकीय सलाह के न बदलें या बंद न करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare