



ब्रांड नाम: CZONE FORTE-1.5 INJ

संरचना: सेफोपेराजोन सोडियम 1 ग्राम + सुलबैक्टम सोडियम 0.5 ग्राम

सामान्य जानकारी

CZONE FORTE-1.5 INJ सेफोपेराजोन सोडियम और सुलबैक्टम सोडियम का एक प्रभावी संयोजन है, जो बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स और बीटा-लैक्टमसे इनहिबिटर के वर्ग से संबंधित है। सेफोपेराजोन एक तीसरी पीढ़ी का सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को नष्ट करके संक्रमण का इलाज करता है। सुलबैक्टम, सेफोपेराजोन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित बीटा-लैक्टमसे एंजाइम को रोकता है।

संकेत और उपयोग

यह इंजेक्शन गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए उपयुक्त है, जैसे:

- श्वसन तंत्र संक्रमण
- मूत्र मार्ग संक्रमण
- त्वचा और कोमल ऊतक संक्रमण
- पेट के अंदरूनी संक्रमण
- हड्डी और जोड़ों का संक्रमण

- सेप्सिस और अन्य प्रणालीगत संक्रमण
-

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

- **सामान्य दुष्प्रभाव:** मतली, उल्टी, दस्त, इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन।
- **कम सामान्य दुष्प्रभाव:** एलर्जी प्रतिक्रियाएं जैसे कि खुजली, दाने, सांस लेने में कठिनाई; सिरदर्द; चक्कर आना; या बुखार।

यदि दुष्प्रभाव बने रहें या बढ़ जाएं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

मात्रा और प्रशासन

CZONE FORTE-1.5 INJ को स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा मांसपेशियों (इंट्रामस्क्युलर) या नस (इंट्रावेनस) में इंजेक्ट किया जाना चाहिए। खुराक और उपचार की अवधि संक्रमण के प्रकार, गंभीरता और रोगी की स्थिति पर निर्भर करती है। हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।

चेतावनी और सावधानियां

- यदि आपको पेनिसिलिन या सेफालोस्पोरिन से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
 - गुर्दे या जिगर की समस्या वाले मरीजों में इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करें।
 - उपचार के दौरान शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह सेफोपेराजोन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
-

दवा अंतःक्रियाएं

यह इंजेक्शन निम्नलिखित के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है:

- रक्त पतला करने वाली दवाएं, जैसे वॉरफारिन
- अन्य एंटीबायोटिक्स
- कुछ मूत्रवर्धक या नेफ्रोटॉक्सिक दवाएं

उपचार शुरू करने से पहले, अपने डॉक्टर को अपनी सभी चल रही दवाओं के बारे में जानकारी दें।

मतभेद

- सेफोपेराजोन, सुलबैक्टम या अन्य सेफालोस्पोरिन से एलर्जी वाले मरीज।
 - बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं के इतिहास वाले मरीज।
-

क्या करें और क्या न करें

- **क्या करें:** अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक को पूरा करें।
 - **क्या न करें:** दवा को बीच में बंद न करें, भले ही लक्षणों में सुधार हो, बिना डॉक्टर से परामर्श किए।
-

CZONE FORTE-1.5 INJ लेने से पहले

- अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भधारण की योजना बना रही हैं।
 - अपनी सभी मौजूदा चिकित्सीय स्थितियों या दवाओं पर चर्चा करें।
-

इकॉन हेल्थकेयर की गुणवत्ता का भरोसा

CZONE FORTE-1.5 INJ **Econ Healthcare Pvt Ltd** का एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जो सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

पता: 11, प्रथम तल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन नंबर: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं हो सकती। हमेशा इस दवा का उपयोग अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार करें। बिना स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श किए खुराक को न बदलें।

सभी अधिकार इकॉन हेल्थकेयर के लिए सुरक्षित हैं।