



Composition:

Each film coated tablet contains :

Dapagliflozin Propanediol Monohydrate
Equivalent to Dapagliflozin 10 mg
Metformin Hydrochloride IP 500 mg
(Extended Release)

Excipients q.s.

Colours : Titanium Dioxide IP & Ferric Oxide Yellow USP-NF

Dosage: As directed by the Physician

Direction for use: Tablet to be swallowed whole.

Not to be chewed, broken or crushed.

Keep out of reach of children.

Store below 30°C.

WARNING : To be sold by retail on the prescription of a Registered Medical Practitioner only.

SCHEDULE G PRESCRIPTION DRUG - CAUTION
It is dangerous to take this preparation except under medical supervision.

Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd.
Plot No. 79,80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403

DAPACOOOL-M TAB उत्पाद जानकारी

ब्रांड नाम: DAPACOOOL-M TAB

संघटन:

- **Dapagliflozin Propanediol Monohydrate (Dapagliflozin के समकक्ष) 10 mg**
- **Metformin Hydrochloride IP 500 mg**

निर्माणकर्ता:

Econ Healthcare Pvt Ltd

11, पहली मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सामान्य जानकारी

DAPACOOOL-M TAB दो सक्रिय तत्वों का संयोजन है: Dapagliflozin, जो एक SGLT-2 इनहिबिटर है, और Metformin, जो एक बिगुआनाइड है, जिसका उपयोग Type 2 डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है।

Dapagliflozin मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। Metformin यकृत में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है और शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। ये दोनों दवाएं मिलकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जब आहार और व्यायाम पर्याप्त नहीं होते।

कक्षा

- **Dapagliflozin:** SGLT-2 इनहिबिटर
- **Metformin:** बिगुआनाइड

निर्देश और उपयोग

DAPACOOOL-M TAB का उपयोग वयस्कों में Type 2 डायबिटीज मेलनितस के इलाज के लिए किया जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आहार और व्यायाम के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

सामान्य साइड इफेक्ट्स

- पेट में असुविधा, जैसे मिचली, उल्टी या दस्त
- बढ़ी हुई पेशाब
- रक्त शर्करा का स्तर कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया), विशेष रूप से अन्य दवाओं के साथ
- वजन में कमी

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स

- चक्कर आना या हलका महसूस होना
- सिरदर्द
- निर्जलीकरण या मुंह का सूखापन
- थकान
- मूत्र पथ संक्रमण (UTI)

खुराक और प्रशासन

- **सुझाई गई खुराक:** DAPACOOOL-M TAB को दिन में एक या दो बार लिया जा सकता है, जैसा कि आपके चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया गया हो।
- **प्रशासन:** यह टैबलेट भोजन के साथ लेना चाहिए, ताकि पेट में असुविधा की संभावना कम हो।
- **समायोजन:** आपके डॉक्टर आपके उपचार के प्रति प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर खुराक को समायोजित कर सकते हैं।

चेतावनियां और सावधानियां

- **गुर्दे की कार्यक्षमता:** नियमित रूप से गुर्दे की कार्यक्षमता की निगरानी आवश्यक है, क्योंकि Dapagliflozin गुर्दे की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डाल सकता है।

- **निर्जलीकरण:** Dapagliflozin मूत्र उत्पादन बढ़ाता है, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है। पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन सुनिश्चित करें।
- **हाइपोग्लाइसीमिया:** विशेष रूप से यदि आप अन्य एंटी-डायबिटिक दवाओं पर हैं, तो रक्त शर्करा कम होने का ध्यान रखें।
- **हृदय और यकृत स्वास्थ्य:** हृदय रोग, यकृत समस्याओं या अन्य चयापचय विकारों वाले रोगियों में सावधानी से उपयोग करें।

दवाइयों के इंटरएक्शन

- DAPACOOOL-M TAB अन्य दवाओं के साथ इंटरएक्ट कर सकता है, जैसे मूत्रवर्धक, ACE इनहिबिटर्स, ARBs, इंसुलिन और अन्य एंटी-डायबिटिक दवाएं।
- अपनी सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स शामिल हैं।

विरोधाभास

- Dapagliflozin, Metformin या इस उत्पाद के किसी भी घटक से एलर्जी
- गंभीर गुर्दे या यकृत की समस्याएं
- डायबिटिक किटोएसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस

क्या करें और क्या न करें

- **क्या करें:**
 - अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें।
 - नियमित रूप से रक्त शर्करा की निगरानी करें।
 - संतुलित आहार और व्यायाम बनाए रखें।
 - निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।
- **क्या न करें:**
 - बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना बंद न करें या खुराक बदलें।
 - शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह हाइपोग्लाइसीमिया या लैक्टिक एसिडोसिस का जोखिम बढ़ा सकता है।
 - यदि आपके पास गंभीर गुर्दे या यकृत की समस्याएं हैं, तो इस दवा का सेवन न करें।

लेने से पहले

DAPACOOOL-M TAB लेने से पहले, अपने डॉक्टर को निम्नलिखित के बारे में सूचित करें:

- गुर्दे या यकृत की समस्याओं का इतिहास
- हृदय रोग या हृदय विफलता
- दवाओं के प्रति किसी भी प्रकार की एलर्जी

- गर्भावस्था या स्तनपान की स्थिति (यह दवा गर्भावस्था के दौरान उपयोग नहीं की जानी चाहिए)।

अस्वीकरण

यह उत्पाद जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है और आपके चिकित्सक की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। हमेशा अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक का पालन करें और इसे बिना उनसे परामर्श किए न बदलें। यह दवा केवल निर्धारित निर्देशों के अनुसार सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए ली जानी चाहिए।

सभी अधिकार सुरक्षित - Econ Healthcare Pvt Ltd

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: www.econhealthcare.net या हमें +91 635-6666-700 पर संपर्क करें।

0