



Rx Sitagliptin & Dapagliflozin Tablets				
DAPACOOOL-S डापाकूल-एस Tablets				
10 x 10 Tablets				
Composition: Each film coated tablet contains: Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP eq. to Sitagliptin 100 mg Dapagliflozin Propanediol Monohydrate Eq. to Dapagliflozin 10 mg Excipients q.s. Colour: Titanium Dioxide IP		Store protected from light & moisture at a temperature not exceeding 30°C. Keep the medicine out of reach of children.		
Dosage: As directed by the physician.		CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner		
		Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd. Plot No. 79,80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar-249403		

DAPACOOOL-S TAB उत्पाद सूचना पृष्ठ

ब्रांड नाम: DAPACOOOL-S TAB

संयोजन:

- Sitagliptin Phosphate Monohydrate Eq. to Sitagliptin 100 mg
- Dapagliflozin Propanediol Monohydrate Eq. to Dapagliflozin 10 mg

निर्माता: Econ Healthcare Pvt Ltd

पता: 11, First Floor, Science City Road, Sola, Ahmedabad

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सामान्य जानकारी:

DAPACOOOL-S TAB एक संयोजन दवा है जो दो प्रभावी तत्वों: Sitagliptin और Dapagliflozin को मिलाकर बनाई जाती है। Sitagliptin एक DPP-4 अवरोधक है जो भोजन के बाद इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है, और Dapagliflozin एक SGLT2 अवरोधक है जो अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह संयोजन प्रकार 2 डायबिटीज वाले वयस्कों में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कक्षा:

- Sitagliptin: DPP-4 अवरोधक
- Dapagliflozin: SGLT2 अवरोधक

उपयोग और संकेत:

- प्रकार 2 डायबिटीज के प्रबंधन में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार।
- आहार और व्यायाम के साथ उपचार योजना का हिस्सा के रूप में उपयोग किया जाता है।

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- सिरदर्द
- नासिका अवरोध
- ऊपरी श्वसन मार्ग संक्रमण
- पीठ दर्द
- दस्त

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- रक्त शर्करा का कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया)
- निर्जलीकरण
- चक्कर आना
- मितली
- गुर्दे की समस्याएं

खुराक और प्रशासन:

DAPACOOOL-S TAB की अनुशंसित खुराक एक टैबलेट प्रतिदिन है, जो भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। खुराक रोगी की स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार भिन्न हो सकती है। हमेशा निर्धारित खुराक का पालन करें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- उपचार के दौरान नियमित रूप से गुर्दे की कार्यप्रणाली की निगरानी करें।
- विशेष रूप से वृद्ध रोगियों में निर्जलीकरण और निम्न रक्त दबाव का जोखिम।
- मूत्र पथ संक्रमण और जननांग संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उपयोग की सिफारिश नहीं की जाती है।
- यदि आपको दिल की विफलता, गुर्दे की बीमारी या यकृत विकारों का इतिहास है, तो सावधानी से इसका उपयोग करें।

दवा इंटरएक्शन:

- अन्य रक्त शर्करा कम करने वाली दवाओं, जैसे sulfonylureas या इंसुलिन के साथ इंटरएक्शन हो सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ सकता है।
- दवाएं जो गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं, DAPACOOOL-S TAB की प्रभावशीलता को बदल सकती हैं।

निषेधाज्ञाएँ:

- प्रकार 1 डायबिटीज वाले रोगियों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- गंभीर गुर्दे की असामान्यता या अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों में निषेध।
- यदि आपको Sitagliptin या Dapagliflozin के किसी भी घटक से एलर्जी है तो इसका उपयोग न करें।

क्या करें और क्या न करें:

- खुराक को न छोड़ें; दवा को जैसा निर्धारित किया गया है वैसा लें।
- निर्धारित मात्रा से अधिक न लें।
- यदि आप किसी घटक से एलर्जी हैं तो इस उत्पाद का उपयोग न करें।
- DAPACOOOL-S TAB का उपयोग बिना डॉक्टर से परामर्श किए बंद न करें।
- इस दवा के दौरान अत्यधिक शराब पीने से बचें।

DAPACOOOL-S TAB लेने से पहले:

- अपने डॉक्टर को किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों के बारे में बताएं, विशेष रूप से गुर्दे या यकृत की समस्याओं के बारे में।
- सभी दवाओं की सूची दें, जो आप वर्तमान में ले रहे हैं, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके रक्त शर्करा स्तरों की नियमित निगरानी की जा रही है।

अस्वीकृति:

यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इन दवाओं का सेवन हमेशा अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार करें। दवा की निर्धारित खुराक को बिना डॉक्टर से परामर्श किए न बदलें।

सभी अधिकार सुरक्षित हैं - Econ Healthcare