

<p>Rx</p> <p style="font-size: 1.2em;">Sitagliptin, Dapagliflozin & Metformin</p> <p style="font-size: 1.2em;">Hydrochloride Extended Release</p> <p style="font-size: 1.2em;">Tablets (100+10+500mg)</p> <p style="font-size: 1.2em; color: #008080;">DAPACOOOL-SM</p> <p>डापाकूल-एसएम Tablets</p> <p style="margin-top: 20px;">10 x 10 Tablets</p>	<p>Composition:</p> <p>Each film-coated bilayered tablet contains:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Eq. to Sitagliptin</td> <td style="text-align: right;">100 mg</td> </tr> <tr> <td>Dapagliflozin propanediol monohydrate Eq. to Dapagliflozin</td> <td style="text-align: right;">10 mg</td> </tr> <tr> <td>Metformin Hydrochloride IP</td> <td style="text-align: right;">500 mg</td> </tr> </table> <p>(As Extended Release form)</p> <p>Excipients q.s.</p> <p>Colour: Sunset Yellow (In Sitagliptin & Dapagliflozin Layer)</p> <p>Dosage : As directed by the Physician.</p> <p>Store protected from light & moisture at a temperature not exceeding 30°C.</p> <p>Keep the medicine out of reach of children.</p> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 0.8em;"> SCHEDULE G PRESCRIPTION DRUG - CAUTION It is dangerous to take this preparation except under medical supervision. </div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 0.8em;"> CAUTION : Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner. </div> <p>Tablet should be swallowed whole. Not to be chewed, broken or crushed.</p>	Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Eq. to Sitagliptin	100 mg	Dapagliflozin propanediol monohydrate Eq. to Dapagliflozin	10 mg	Metformin Hydrochloride IP	500 mg
Sitagliptin Phosphate Monohydrate IP Eq. to Sitagliptin	100 mg						
Dapagliflozin propanediol monohydrate Eq. to Dapagliflozin	10 mg						
Metformin Hydrochloride IP	500 mg						

DAPACOOOL-SM TAB का उत्पाद जानकारी

ब्रांड नाम: DAPACOOOL-SM TAB

सामग्री:

- डैपाग्लिफ्लोजिन प्रोपेनेडिओल मोनोहाइड्रेट समकक्ष डैपाग्लिफ्लोजिन 10 मिग्रा
- सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी समकक्ष सिटाग्लिप्टिन 100 मिग्रा
- मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा

सामान्य जानकारी:

DAPACOOOL-SM एक संयोजन दवा है जो टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन की गई है। डैपाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन का संयोजन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने के लिए शरीर में विभिन्न तंत्रों पर काम करता है। डैपाग्लिफ्लोजिन गुर्दे के माध्यम से अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र में बाहर निकालता है, सिटाग्लिप्टिन इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है और मेटफॉर्मिन यकृत में ग्लूकोज उत्पादन को कम करता है, जो सभी रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार में योगदान करते हैं।

दवा वर्ग:

- डैपाग्लिफ्लोजिन: SGLT2 अवरोधक
- सिटाग्लिप्टिन: DPP-4 अवरोधक

- मेटफॉर्मिन: बिगुआनाइड

संकेत और उपयोग:

- वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह मेलिटस का प्रबंधन।
- आहार और व्यायाम के साथ रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है।
- टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्तियों में जो आहार और व्यायाम से पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनमें ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने में मदद करता है।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण
- सिरदर्द
- दस्त
- मितली
- हाइपोग्लाइसीमिया (कम रक्त शर्करा)

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना
- पेट दर्द
- थकान
- पीठ दर्द
- मूत्र का अधिक आना

खुराक और प्रशासन:

- सामान्य रूप से, एक टैबलेट प्रति दिन एक बार भोजन के साथ ली जाती है, ताकि पाचन तंत्र पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।
- खुराक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।
- निर्धारित खुराक का पालन करना आवश्यक है और इसे कभी अधिक न लें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- इस दवा का उपयोग करते समय किडनी कार्य की नियमित निगरानी आवश्यक है।
- DAPACOOOL-SM का उपयोग गंभीर किडनी विकारों या मधुमेह किटोनोसिडोसिस (DKA) वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है।
- यकृत समस्याओं, निर्जलीकरण या निम्न रक्तदाब वाले रोगियों में सावधानी के साथ उपयोग करें।
- मूत्र पथ के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

दवा इंटरएक्शन:

- डाययूरेटिक्स, इंसुलिन या अन्य मौखिक मधुमेह दवाओं के साथ इंटरएक्ट कर सकती है।
- अपने डॉक्टर को यह बताना सुनिश्चित करें कि आप कौन सी दवाएं ले रहे हैं, जिसमें ओवर-द-काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं।
- DAPACOOOL-SM लेते समय शराब का सेवन न करें, क्योंकि इससे मेटफॉर्मिन के साथ लैक्टिक एसिडोसिस का जोखिम बढ़ सकता है।

प्रतिबंध:

- इस दवा के किसी भी घटक से एलर्जी होने पर।
- गंभीर गुर्दे की अक्षमता (eGFR < 30 ml/min/1.73 m²)।
- मधुमेह किटोनोसिडोसिस।
- गर्भावस्था और स्तनपान (जब तक डॉक्टर द्वारा निर्धारित न हो)।

क्या करें और क्या न करें:

- **क्या करें:** दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार लें।
- **क्या करें:** रक्त शर्करा की नियमित निगरानी करें।
- **क्या न करें:** खुराक न छोड़ें।
- **क्या न करें:** निर्धारित खुराक से अधिक न लें।
- **क्या करें:** एक स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या बनाए रखें।
- **क्या न करें:** बिना अपने डॉक्टर से परामर्श किए इस दवा को न रोकें।

लेने से पहले:

- यदि आपके पास किडनी या यकृत रोग, हृदय संबंधी समस्याएं हैं, या यदि आप गर्भवती या स्तनपान करवा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें।
- सुनिश्चित करें कि आपका डॉक्टर जानता है कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं ताकि दवा इंटरएक्शन से बचा जा सके।

अस्वीकरण:

इन दवाओं का सेवन हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है और इसे निर्धारित खुराक बदलने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा दी गई सलाह और खुराक निर्देशों का पालन करें।

निर्माता:

Econ Healthcare Pvt Ltd
11, First Floor, Science City Road, Sola, Ahmedabad

संपर्क जानकारी:

फोन: +91 635-6666-700
ईमेल: info@econhealthcare.net
वेबसाइट: www.econhealthcare.net

Econ Healthcare के पास सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

यह उत्पाद जानकारी DAPACOOOL-SM के बारे में मरीजों को पूरी जानकारी प्रदान करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के मार्गदर्शन में सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है।