



Rx Febuxostat Tablets Febstar®-40 Tablets फेबस्टार - ४०		
10 x 10 Tablets		
Composition : Each film coated tablet contains : Febuxostat 40 mg Excipients Q.S. Color : Titanium Dioxide IP Dose: As directed by the Physician Storage : Store protected from light & moisture at a temperature not exceeding 30° C.	Febstar® - 40 फेबस्टार - ४० Tablets Keep medicine out of reach of children CAUTION Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner. Mfg. by :Shantam Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 546/2, At, Rakanpur, Ta. Kalol,Dist.Gandhinagar - 382 721 www.shantampharmaceuticals.com	

ब्रांड नाम: FEBSTAR-40 TAB

संरचना: Febuxostat 40mg

सामान्य जानकारी

FEBSTAR-40 TAB में Febuxostat होता है, जो एक जैथिन ऑक्सिडेज़ इनहिबिटर है। इसका उपयोग गाउट (गठिया) वाले वयस्कों में हाइपरयूरिसेमिया के प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह शरीर में यूरिक एसिड के उत्पादन को कम करता है, जिससे गाउट के हमलों और उच्च यूरिक एसिड के कारण होने वाली जटिलताओं को रोका जा सकता है।

श्रेणी:

जैथिन ऑक्सिडेज़ इनहिबिटर

संकेत और उपयोग:

- गाउट से पीड़ित मरीजों में क्रॉनिक हाइपरयूरिसेमिया का इलाज।
- उन स्थितियों में यूरिक एसिड के स्तर का प्रबंधन जहां इसका अत्यधिक उत्पादन होता है।

सामान्य और कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- मतली
- जोड़ों का दर्द
- त्वचा पर चकत्ते

- लीवर एंजाइम असामान्यताएं

कम सामान्य साइड इफेक्ट्स:

- चक्कर आना
- थकान
- दस्त
- हृदय संबंधी लक्षण, जैसे सीने में दर्द (दुर्लभ)

खुराक और प्रशासन:

सामान्य अनुशंसित खुराक एक टैबलेट (40mg) प्रतिदिन एक बार है, भोजन के साथ या बिना। खुराक मरीज की स्थिति और डॉक्टर की सलाह के अनुसार भिन्न हो सकती है।

चेतावनियां और सावधानियां:

- यूरिक एसिड के स्तर और लीवर फंक्शन टेस्ट की नियमित जांच करवाएं।
- हृदय संबंधी बीमारियों वाले मरीजों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए।
- गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान उपयोग से पहले डॉक्टर से परामर्श करें।

ड्रग इंटरैक्शन:

FEBSTAR-40 निम्नलिखित दवाओं के साथ क्रिया कर सकता है:

- Azathioprine
- Mercaptopurine
- Theophylline
अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप वर्तमान में ले रहे हैं।

मतभेद (Contraindications):

- Febuxostat या इस दवा के किसी भी घटक से एलर्जी।
- गंभीर लीवर या किडनी की समस्याएं।

क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

- दवा को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- उपचार का समर्थन करने के लिए कम प्यूरिन वाला आहार लें।
- किडनी स्टोन को रोकने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

क्या न करें:

- डॉक्टर से परामर्श किए बिना दवा लेना बंद न करें।
- शराब का सेवन न करें क्योंकि यह यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है।

- किसी अन्य दवा को डॉक्टर की अनुमति के बिना न लें।

FEBSTAR-40 TAB लेने से पहले:

- यदि आपको लीवर या किडनी की बीमारी का इतिहास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- किसी भी हृदय संबंधी समस्या या एलर्जी के बारे में डॉक्टर से चर्चा करें।

Econ Healthcare का गुणवत्तापूर्ण उत्पाद

पता: 11, फर्स्ट फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। दवा का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक को न बदलें और न ही रोकें।

सभी अधिकार Econ Healthcare के लिए सुरक्षित हैं।