



Rx
Rosuvastatin and
Fenofibrate Tablets IP

Recotor®-F
TABLETS

10 x 10 Tablets

रिक्टोर-एफ

Composition :
Each film coated tablet contains:
Rosuvastatin Calcium IP
eq. to Rosuvastatin 10 mg
Fenofibrate IP 160 mg
Colour : Titanium Dioxide IP

Keep out of reach of children.

Dosage :
As directed by the Physician.

Storage :
Store protected from light &
moisture, at a temperature
not exceeding 30°C.

**SCHEDULE H PRESCRIPTION
DRUG – CAUTION**
Not to be sold by retail without
the prescription of a Registered
Medical Practitioner.

ब्रांड नाम: RECOTOR F TAB

सक्रिय घटक: रोसुवास्टेटिन 10mg + फेनोफाइब्रेट 160mg

निर्माता: इकॉन्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

पता: 11, पहले फ्लोर, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

सामान्य जानकारी:

RECOTOR F TAB दो प्रभावी दवाओं—रोसुवास्टेटिन और फेनोफाइब्रेट का संयोजन है। इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने और हृदयवाहिकीय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। रोसुवास्टेटिन एक स्टेटिन श्रेणी की दवा है, जबकि फेनोफाइब्रेट एक फाइब्रेट है जो ट्राइग्लिसराइड स्तर को कम करने और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है।

सूचक और उपयोग:

- **हाइपरकोलेस्ट्रॉलेमिया:** उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर का इलाज।
- **हाइपरट्राइग्लिसरिडेमिया:** उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर को कम करना।
- **हृदयवाहिकीय जोखिम में कमी:** हृदयाघात, स्ट्रोक और अन्य हृदयवाहिकीय रोगों से बचाव में मदद करता है।
- **संयोजन उपयोग:** जब अकेले रोसुवास्टेटिन या फेनोफाइब्रेट से उपचार अपर्याप्त हो, तो यह संयोजन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तरों को बेहतर नियंत्रित करता है।

सामान्य दुष्प्रभाव:

- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी
- सिरदर्द
- मिचली और पेट में असुविधा
- यकृत एंजाइमों का बढ़ना
- थकान

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- जोड़ों में दर्द
- पाचन समस्याएँ, जैसे दस्त या कब्ज
- चकत्ते या खुजली

खुराक और प्रशासन:

- सामान्यतः एक बार दैनिक लिया जाता है, भोजन के साथ या बिना।
- खुराक का निर्धारण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए।
- निर्धारित खुराक से अधिक न लें।

चेतावनियाँ और सावधानियाँ:

- यकृत कार्य को नियमित रूप से मॉनीटर करें क्योंकि स्टेटिन यकृत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- मांसपेशी समस्याएं, जिनमें रैब्डोमायोलिसिस, हो सकती हैं—अगर असामान्य मांसपेशी दर्द या कमजोरी महसूस हो तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।
- शराब का सेवन न करें क्योंकि यह यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यकृत रोग, किडनी रोग या मांसपेशी विकारों वाले व्यक्तियों में इसका उपयोग सावधानी से करें।

दवा की इंटरएक्शन:

- **एंटासिड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स** रोसुवास्टेटिन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं।
- **वारफारिन** (रक्त पतला करने वाली दवा) फेनोफाइब्रेट के साथ इंटरएक्ट कर सकता है, जो रक्त के थक्के जमने को प्रभावित कर सकता है।
- अपने डॉक्टर को अपनी सभी दवाओं और ओवर-द-काउंटर दवाओं के बारे में सूचित करें।

निषेध:

- रोसुवास्टेटिन, फेनोफाइब्रेट या किसी अन्य घटक से एलर्जी होने पर इसका उपयोग न करें।
- सक्रिय यकृत रोग या लगातार बढ़े हुए यकृत एंजाइमों की स्थिति में इसका उपयोग न करें।
- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

- गंभीर किडनी विकार या मांसपेशी विकार वाले व्यक्तियों में निषेध।

क्या करें और क्या न करें:

- **क्या करें:**
 - अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक का पालन करें।
 - स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या बनाए रखें।
 - नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर की जांच करवाएं।
- **क्या न करें:**
 - शराब का सेवन न करें।
 - रोसुवास्टेटिन के साथ अंगूर का रस न लें क्योंकि इससे इंटरैक्शन हो सकता है।
 - डॉक्टर से परामर्श किए बिना अपनी खुराक न बदलें।

लेने से पहले:

- अपने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से अपनी चिकित्सा इतिहास के बारे में चर्चा करें, विशेष रूप से अगर आपको यकृत या किडनी की समस्याएं हैं, मांसपेशियों की समस्याएं हैं या आपको स्ट्रोक का इतिहास है।
- यदि आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि आपके डॉक्टर को आपकी सभी अन्य दवाओं या सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी हो।

अस्वीकरण:

यह उत्पाद जानकारी सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए है। हमेशा इस दवा का उपयोग अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की मार्गदर्शन में करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक को बिना परामर्श के न बदलें।

इकॉन्स हेल्थकेयर के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।