



Telmisartan & Metoprolol Succinate (ER) Tablets	
Telmicon-M 50 टेल्मिकॉन-एम ५० Tablets	
10x10 Tablets	
Composition : Each film coated tablet contains : Metoprolol Succinate IP 50 mg. (As extended release form) Telmisartan IP 40 mg. Excipients q.s. Colour : Titanium Dioxide IP	Store in a cool & dry place. Protect from light & moisture Keep the medicine out of reach of children. Do not use in pregnancy.
Dosage : As directed by the Physician.	SCHEDULE H PRESCRIPTION DRUG - CAUTION : Not to be sold by retail without the prescription of a Registered Medical Practitioner. Manufactured by: Mascot Health Series Pvt. Ltd. At-Plot No. 52, Sec-6A, IIE, Sidoul, Haridwar-249403, Uttarakhand.

टेल्मिकॉन M-50 टैब

संरचना: टेल्मिसार्टन 40mg + मेटोप्रोलोल 50mg

सामान्य जानकारी

टेल्मिकॉन M-50 टैब एक संयोजन दवा है जिसमें **टेल्मिसार्टन**, जो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर (ARB) है, और **मेटोप्रोलोल**, जो एक बीटा-ब्लॉकर है, शामिल है। यह उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) के प्रभावी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन की गई है, और दिल के दौरों, स्ट्रोक और किडनी की क्षति जैसे हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करती है।

श्रेणी

- **टेल्मिसार्टन:** एंजियोटेंसिन II रिसेप्टर ब्लॉकर (ARB)
- **मेटोप्रोलोल:** बीटा-ब्लॉकर

संकेत और उपयोग

- उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) का उपचार
- हृदय संबंधी जटिलताओं जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक की रोकथाम
- दिल की विफलता और दिल की गति को नियंत्रित करना

सामान्य और कम सामान्य दुष्प्रभाव

सामान्य दुष्प्रभाव:

- चक्कर आना या हल्का सिरदर्द
- थकान
- मतली
- धीमी हृदय गति

कम सामान्य दुष्प्रभाव:

- निम्न रक्तचाप (हाइपोटेंशन)
- हाथ, पैर या टखनों में सूजन
- सांस लेने में कठिनाई
- नींद में बाधा

खुराक और प्रशासन

- दवा को मौखिक रूप से भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, आमतौर पर दिन में एक बार या डॉक्टर के निर्देशानुसार।
- खुराक रोगी की स्थिति और उपचार की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है।

चेतावनी और सावधानियां

- दवा को अचानक बंद न करें, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं।
- गुर्दे, जिगर या हृदय की समस्याओं वाले मरीजों में सावधानी से उपयोग करें।
- उपचार के दौरान नियमित रूप से रक्तचाप और हृदय गति की निगरानी करें।

दवा परस्पर क्रियाएं

- अन्य रक्तचाप की दवाओं, एंटी-अरिदमिक दवाओं, या एनएसएआईडी के साथ परस्पर क्रियाएं हो सकती हैं।
- डॉक्टर को सभी अन्य दवाओं, सप्लीमेंट्स या हर्बल उत्पादों के बारे में सूचित करें।

मतभेद

- टेल्मिसार्टन, मेटोप्रोलोल, या किसी भी घटक के प्रति अतिसंवेदनशीलता।

- बिना पेसमेकर के गंभीर ब्रेडीकार्डिया या हार्ट ब्लॉक।
 - गंभीर जिगर या गुर्दे की समस्याओं वाले मरीज।
-

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

- दवा को डॉक्टर के निर्देशानुसार लें।
- बेहतर परिणामों के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या बनाए रखें।
- नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी करें।

क्या न करें:

- खुराक न छोड़ें या दवा को डॉक्टर से परामर्श किए बिना बंद न करें।
 - शराब से बचें, जो दुष्प्रभावों को बढ़ा सकता है।
 - यदि चक्कर आए तो सतर्कता की आवश्यकता वाली गतिविधियों से बचें।
-

टेल्मिकॉन M-50 टैब लेने से पहले

- डॉक्टर को किसी भी पहले से मौजूद बीमारियों, विशेष रूप से हृदय, जिगर या गुर्दे की समस्याओं के बारे में बताएं।
 - यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो डॉक्टर को सूचित करें।
-

इकोन हेल्थकेयर की प्रतिबद्धता

टेल्मिकॉन M-50 टैब को इकोन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ निर्मित किया गया है, जो मरीजों की प्रभावशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इकोन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

पता: 11, प्रथम मंजिल, साइंस सिटी रोड, सोल, अहमदाबाद

फोन: +91 635-6666-700

ईमेल: info@econhealthcare.net

वेबसाइट: www.econhealthcare.net

अस्वीकरण

यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है और यह चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। हमेशा टेल्मिकॉन M-50 टैब को डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। डॉक्टर की सलाह के बिना खुराक में बदलाव न करें।

सर्वाधिकार सुरक्षित: इकोन हेल्थकेयर

